

Protocol a la Llar El Pinet Xic sobre malalties comunes

La salut a l'escola

L'infant petit necessita trobar-se bé per relacionar-se, jugar i aprendre. Sovint pot patir refredats o altres malalties contagioses, perquè encara no té un sistema immunològic prou madur. En cas de malaltia cal que consulteu al metge i seguïu les seves recomanacions. Cal tenir previst qui atindrà el vostre fill/a quan no pugui venir a l'escola.

Quan estigui malalt o tingui febre, s'ha de quedar a casa, tant per ell mateix, com també per no contagiar els seus companys.

Administrar la medicació a casa

Quan l'infant hagi de prendre una medicació recomanem que ho faci a casa. En cas imprescindible cal que signeu l'autorització (la trobareu a la web), especificant l'horari i la dosi de medicament a administrar i ensenyeu la recepta mèdica a les mestres.

Si l'infant mostra símptomes de malaltia a l'escola

Avisarem a la família perquè vingueu a buscar al vostre fill/a el més aviat possible i rebí l'adequada atenció mèdica. En cas de que no pugueu venir immediatament a recollir el vostre infant, l'escola administrará paracetamol només per símptomes de febre a partir de 38º prèvia autorització signada (web) i comentada amb la família via telèfon.

En cas d'accident o urgència

Es farà la primera cura i assistència i trucarem a la família per informar. Només es trucarà als serveis d'urgències si l'accident o malaltia ho requereix.

Us demanem que comuniquem la "NO" assistència per malaltia

Quan un infant falti a l'escola per qualsevol motiu de salut la família ho ha de comunicar el més aviat possible, de manera que si es tractés d'una malaltia transmissible es puguin fer les accions oportunes per tal de prevenir el seu contagi a les altres persones de la comunitat.

No el podeu portar a l'escola (si és a l'escola us trucaran perquè el passeu a buscar) si presenta algun d'aquests símptomes:

Malaltia	Símptomes	Període de no-assistència
Febre	37'5 graus o més de febre	Si l'infant marxa de l'escola amb febre, l'endemà no pot venir. Podrà tornar després de 24 h sense febre i sense antitèrmics.
Diarrees líquides	Deposicions líquides	Si l'infant marxa de l'escola amb diarrea abundant l'endemà no pot venir. No pot tornar fins que

		s'hagin normalitzat les deposicions.
Cucs	Aparició de cucs a les deposicions.	Fins 24 hores que s'hagi fet el tractament
Varicel·la	Aparició de petites vesícules per tot el cos de produeixen picor.	L'infant no pot tornar a l'escola fins que se li assequin totalment les lesions (entre 6 i 8 dies)
Boca-mans-peus	Vesícules a la zona de boca, mà i peu	No pot tornar l'escola mentre presenti febre o lesions obertes. (3 a 5 dies)
Estomatitis aftosa	aftes a la boca	No pot tornar a l'escola mentre presenti febre o lesions obertes.
Polls	Polls	Si l'infant té polls se n'ha d'informar a l'escola. És recomanable que tot alumne afectat no assisteixi a l'escola fins que no sigui sotmès al tractament. S'entén per tractament l'aplicació de loció o crema i l'eliminació de les llémenes; durant la setmana posterior, cada dia s'ha de revisar el cabell i anar traient les llémenes que hi hagin pogut quedar.
Conjuntivitis	Conjuntiva vermella i/o secrecions blanques o grogues, parpelles enganxades al matí i dolor o vermellor a la zona que envolta l'ull.	Fins a 24 h després d'haver iniciat el tractament
Micosis	Muguet. Fongs a la boca,...	Fins a 24 h després d'haver iniciat el tractament
Impetigen contagiós	Aparició de lesions a la pell, en forma de butllofes que es trenquen amb facilitat deixant una zona vermellosa inflamada que es cobreix d'una crosta groguenca.	Fins a 48 hores després de l'inici del tractament antibiòtic
Infecció respiratòria aguda de vies altes	Febre, mocs abundants.....	Fins almenys 24 hores sense febre i toleri l'activitat general
Faringitis estreptocòccia	Febre, apatia, mal de coll, ganglis inflamats...	Fins a 24 hores després d'iniciar el tractament
Amigdalitis vírica	Febre, mal de coll, pèrdua	No és necessari excloure de

	gana...	l'escola si no presenta febre.
tos ferina (pertussis)	Tos, rinitis, esternuts, febre	Fins a 5 dies després d'haver iniciat el tractament antibiòtic apropiat o 21 dies des de l'inici de la malaltia
Tuberculosis	Febre, apatia, esforç al respirar...	Fins que el metge no determini que no és infecció (mínim 2-3 setmanes després de l'inici del tractament)
Grip	Febre, mal de panxa, vòmits, diarrees, apatia....	Fins almenys 24 hores sense febre i que toleri l'activitat general

A fi de vetllar per la salut de totes i tots els membres de la nostra comunitat educativa, us demanem que sigueu responsables amb el protocol establert.

AQUEST PROTOCOL ESTÀ MOTIVAT PELS CRITERIS APROVATS PER LA SECRETARIA DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

.....

Protocol de la Llar El Pinet Xic sobre malalties comunes

**Jo amb D.N.I..... mare/pare/tutor
de.....**

em dono per informat i estic d'acord en el compliment d'aquest protocol.

Sant Pau de Segúries a.....de.....202.....

Signatura

